

## PAKKAUSSELOSTE

**Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit  
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit  
isosorbidi-5-mononitraatti**

### Lue tämä pakkausselosesto huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

- Säilytä tämä pakkausselosesto. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle.

### Tässä pakkausselosesteessa esitetään:

1. Mitä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit ovat ja miinii näitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja
3. Miten Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

### 1. MITÄ ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS TABLETIT OVAT JA MIINII NÄITTÄÄ KÄYTETÄÄN

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja käytetään sepelvaltimotaudissa rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisemiseen ja eri syistä johtuvan sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Lääkäri voi määrättää Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja myös muun sairauden hoitoon.

### 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS TABLETTEJA

#### Älä käytä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja, jos

- jos olet allerginen (yliherkkä) isosorbidi-5-mononitraatille tai jollekin muulle Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien sisältämälle apuaineelle (ks. kohta 6).
- olet yliherkkä nitraattivalmisteille.
- sinulla on matalaan verenpaineeseen liittyvä huimausta tai pyörtyilytaipumusta.
- sinulla on sydämen läppävika tai muu sydän- tai verisuonisairaus kuin sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta.

#### Ole erityisen varovainen Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien suhteeseen, jos:

- sinulla on ollut aivoverenkierthäiriötä tai pään alueen vamma.
- sinulla on anemia tai keuhkosairaus.
- sinulla on todettu methemoglobiinireduktasin puute (voi johtaa huonontuneeseen veren hapenkuljetuskykyyn) tai epänormaali hemoglobiinin rakenne.

#### Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä, myös lääkeitä, joita lääkäri ei ole määrennyt. Hoitavan lääkärin on erityisesti tiedettävä jos käytät:

- verenpainelääkeitä.
- verisuonia laajentavia lääkeitä, muita nitraattivalmisteita.
- masennuksen ja mielenterveyden hoitoon käytettäviä lääkeitä.
- dihydroergotamiini migreenilääkeitä.
- potenttilääke sildenaafiilia, tadalafiilia tai vardenaafiilia, sillä ne voivat voimistaa Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien verenpainetta laskevaa vaikutusta hengenvaarallisesti.

#### Raskaus ja imetyksessä

Kysy lääkärltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Tietoa Isosorbide mononitrate Vitabalans -tablettien käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on rajoitetusti. Neuvottele lääkärin kanssa Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletten käytöstä, jos suunnittelet raskautta, olet raskaana tai jos aiottasit imettää.

### Ajamineen ja koneiden käyttö

Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletit saattaa erityisesti hoidon alussa aiheuttaa verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta. Tästä syystä autoa ajettaessa, koneita käytettäessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tehtävissä on noudatettava varovaisuutta. Jos hoitoon ei liity haitallisia sivuvaikutuksia, Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit ei heikennä suorituskykyä liikenteessä tai koneita käytettäessä.

### Ole varovainen Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien kanssa

Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletteja ei ole tarkoitettu äkillisten rintakipukohtausten hoitoon, vaan siihen tarkoitukseen tulee käyttää nopeavaikuttavia valmisteita.

Pitkään jatkunutta Isosorbide mononitrate Vitabalans -hoitoa ei pidä lopettaa äkillisesti, sillä tämä saattaa aiheuttaa rintakipukohtaustia tai sydämen rytmihäiriötä. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Alkoholin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, sillä alkoholi saattaa voimistaa Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien vaikutusta ja aiheuttaa liiallisen verenpaineen laskun.

Jos käytät muita lääkkeitä, on tärkeää noudattaa kaikkien lääkkeiden käytössä lääkärin antamia ohjeita.

## 3. MITEN ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ota Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai aptekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on 1-2 10 mg:n tablettia aamulla ja iltapäivällä tai yksi 20 mg:n tabletti aamulla ja iltapäivällä. Tabletit niellään kokonaисina runsaan nesteen kera.

Annostus on kuitenkin yksilöllinen, ja lääkäri on voinut määrätä ohjeeksi muun kuin edellä mainitun. Noudata aina lääkäriä antamia ohjeita. Jos sinusta tuntuu, että Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkäriille tai apteekkikenkilökunnalle.

### Jos otat enemmän Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos vahingossa otat suuremman annoksen Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja kuin lääkäri on määrännyt, oireina saattaa ilmetä muun muassa sydämentykytystä, kasvojen punoitusta, päänsärkyä, sekavuuden tunnetta, oksetusta ja pyörrytystä. Jos sinulla ilmenee edellä kuvattuja oireita, ota yhteys lääkäriin. Voit myös kysyä neuvoa Myrkystietokeskuksesta (puh. 09-471 977 tai 09-4711 vaihde).

Osa oireista voi johtua liian suuresta hoitoannoksesta. Lääkäri voi tarvittaessa arvioida hoitoannoksen uudelleen.

### Jos lopetat Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien käytön

Jos olet käyttänyt Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja jo useamman viikon ajan, älä lopeta hoitoa äkillisesti, sillä tämä saattaa aiheuttaa rintakipukohtaustia tai sydämen rytmihäiriötä. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, hoitava lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkäriin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

## 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit saattaa etenkin hoitoa aloittettaessa aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka johtuvat sen verisuonia laajentavasta vaikutuksesta. Ne häviävät tai lievittyvät yleensä muutamassa päivässä, ja niitä voidaan välttää aloittamalla pienellä annoksella ja lisäämällä annostusta muutaman päivän välein.

Tavallisimpien haittavaikutuksen on päänsärky. Ellei se häviä muutaman päivän kuluessa tai mikäli se on voimakasta, ota yhteys lääkäriin.

Harvinaisempina haittavaikutuksina voi esiintyä huimausta, heikkoutta tai pyörrytystä (etenkin nopeasti makuulta tai istualta nostessa), kasvojen punoitusta, sydämentykytystä ja lieviä vatsavaivoja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

## **5. ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen (Käyt.viim). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. MUUTA TIETOA**

### **Mitä Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletit sisältää**

- Vaikuttava aine on isosorbidi-5-mononitraatti 10 mg tai 20 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat esigelatioitu maissitärkkelys, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit eivät sisällä laktoosia tai makeutusaineita.

### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot**

Lääkevalmisten kuvaus:

Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg: valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka halkaisija on 7 mm.

Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg: valkoinen, pyöreä, kupera, jakourteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HDPE-muovia ja suljin LDPE-muovia).

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Puh: 03 615 600

Fax: 03 618 3130

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 20.8.2010.

## BIPACKSEDEL

**Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tablett  
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablett  
isosorbid-5-mononitrat**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

**I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad Isosorbide mononitrate Vitabalans är och vad det används för
2. Innan du använder Isosorbide mononitrate Vitabalans
3. Hur du använder Isosorbide mononitrate Vitabalans
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isosorbide mononitrate Vitabalans tablett ska förvaras
6. Övriga upplysningar

**1. VAD ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Isosorbide mononitrate Vitabalans tablett används för att förebygga smärtanfall vid kärlkramp i hjärtat (angina pectoris) och för behandling av olika typer av hjärtsvikt.

Läkaren kan även ha ordinerat Isosorbide mononitrate Vitabalans tablett för behandling av någon annan sjukdom.

**2. INNAN DU ANVÄNDER ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS**

**Använd inte Isosorbide mononitrate Vitabalans om**

- du är allergisk (överkänslig) mot isosorbid-5-mononitrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Isosorbide mononitrate Vitabalans (se avsnitt 6).
- du är överkänslig för nitratprodukter.
- ditt blodtryck är så lågt att du har svindel eller en benägenhet att lätt svimma.
- du har klaffel eller någon annan hjärt- eller kärlsjukdom än de sjukdomar mot vilka Isosorbide mononitrate Vitabalans används.

**Var särskilt försiktig med Isosorbide mononitrate Vitabalans om**

- du har haft störningar i hjärnans blodcirculation eller någon huvudskada.
- du har anemi eller någon lungsjukdom.
- du har konstaterats lida av brist på methemoglobinreduktas (kan försämra blodets förmåga att transportera syre runt i kroppen) eller ha onormal hemoglobinkonstruktion.

**Användning av andra läkemedel**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Din läkare måste speciellt veta om du använder något av följande läkemedel:

- blodtrycksmediciner.
- läkemedel som vidgar blodkärlen, andra nitratpreparat.
- läkemedel som används mot depression eller mot psykiska sjukdomar.
- dihydroergotamin läkemedel mot migrän.
- impotensläkemedlet sildenafil, tadalafil eller varderafil, eftersom de kan förstärka effekten av Isosorbide mononitrate Vitabalans och förorsaka en livsfarlig sänkning av blodtrycket.

**Graviditet och amning**

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Det finns endast begränsad information om användning av Isosorbide mononitrate Vitabalans under graviditet och amning. Diskutera användningen av Isosorbide mononitrate Vitabalans med läkare om du planerar ett havandeskap, du är gravid eller du har för avsikt att amma under behandlingen.

### Körförstående och användning av maskiner

Speciellt i början av behandlingen kan Isosorbide mononitrate Vitabalans förorsaka svindel, vilket beror på att blodtrycket sjunker. Därför skall man vara försiktig vid bilköring, användning av maskiner och med andra precisionskrävande uppgifter. Om behandlingen inte ger ovannämnda biverkningar förminskar Isosorbide mononitrate Vitabalans inte förmågan att klara sig i trafiken eller att använda maskiner.

### Var försiktig med Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletter

Isosorbide mononitrate Vitabalans är inte avsett för att lindra akuta smärtattacker i bröstet. För detta ändamål skall snabbverkande nitratpreparat användas.

Långvarig behandlingen av Isosorbide mononitrate Vitabalans bör inte avbrytas plötsligt eftersom detta kan leda till smärtattacker i bröstet eller rytmstörningar. Om behandlingen av någon orsak måste avbrytas, informerar läkaren om hur detta skall gå till.

Eftersom alkohol kan förstärka effekten av Isosorbide mononitrate Vitabalans och förorsaka en alltför kraftig blodtryckssänkning, skall man vara försiktig vid användning av alkohol.

Om du använder andra läkemedel samtidigt är det viktigt att du följer läkarens anvisningar för hur medicinerna skall användas och i vilken ordning de skall tas.

## 3. HUR DU ANVÄNDER ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS

Använd alltid Isosorbide mononitrate Vitabalans enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på doseringen.

Vanlig dos är 1-2 tablettter å 10 mg på morgonen och på eftermiddagen eller 1 tablett å 20 mg på morgonen och på eftermiddagen. Tabletterna sväljs hela tillsammans med en riklig mängd vätska.

Doseringen är dock individuell och din läkare kan ha ordinerat en dosering som avviker från den som nämns här. Följ alltid läkarens ordination. Om du upplever att effekten av Isosorbide mononitrate Vitabalans är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

### Om du har tagit för stor mängd av Isosorbide mononitrate Vitabalans

Om du av misstag tar en större dos Isosorbide mononitrate Vitabalans än den läkare ordinerat, kan detta förorsaka symtom som t.ex. hjärtklappning, ansiktsrodnad, huvudvärk, virrigitet, kräkningar eller yrsel. Om du upplever de ovan beskrivna symptomen kontakta läkare. Du kan även rådfråga Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977 eller 09-4711 växel).

Ovannämnda symptom kan också bero på för hög daglig dos. Läkaren kan ändra doseringen vid behov.

### Om du slutar att använda Isosorbide mononitrate Vitabalans

Om du har använt Isosorbide mononitrate Vitabalans i flera veckors tid, ska du inte plötsligt avbryta behandlingen eftersom detta kan ge upphov till smärtattacker i bröstet eller störningar i hjärtrytmen. Om du vill avbryta behandlingen kommer din läkare att informera hur du ska gå tillväga.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Isosorbide mononitrate Vitabalans orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Speciellt då behandlingen inleds kan Isosorbide mononitrate Vitabalans förorsaka biverkningar som beror på medicinens kärlvidgande effekt. Dessa biverkningar försvinner eller blir lindrigare inom några dagar och kan ofta undvikas genom att behandlingen inleds med en liten dos som sedan ökas med några dagars mellanrum.

Den vanligaste biverkningen är huvudvärk. Kontakta läkare om värken inte försvinner inom några dagar, eller om den är mycket intensiv.

Mer sällsynta biverkningar är svindel, svaghet eller yrsel (speciellt då man snabbt stiger upp från sittande eller liggande ställning), ansiktsrodnad, hjärtklappning och lindriga magbesvär. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 5. HUR ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS TABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Isosorbide mononitrate Vitabalans efter utgångsdatumet som anges på förpackningen (Utg.dat).

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är 10 mg eller 20 mg isosorbid-5-monohydrat i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettor innehåller inte laktos eller sötningsmedel.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedels utseende:

Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg: vit, rund, konvex tablett. Diametern är 7 mm.

Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg: vit, rund, konvex tablett med brytskåra. Diametern är 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 30 eller 100 tablettor i tablettburk (burk HDPE, lock LDPE)

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Tel: 03 615 600

Fax: 03 618 3130

Denna bipacksedel godkändes senast den 20.8.2010.