

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

TONCILS 5 mg/2 mg imeskelytabletti

Klooriheksidiinidihydrokloridi, bentsokaiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkichenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa aptekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkichenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Toncils imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Toncils imeskelytabletteja
3. Miten Toncils imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Toncils imeskelytablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Toncils imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään

Toncils imeskelytabletteja käytetään suun ja nielun desinfiointiin. Niiden vaikuttava aine klooriheksidiini on laajakirjoinen desinfektioaine, joka tehoaa useimpiin suussa esiintyviin mikrobilajeihin. Se tehoaa useisiin baktereereihin, hiivoihin, dermatofyytti-sieniin ja rasvaliukoisiiin viruksiin. Klooriheksidiini ei tehoa bakteri-itiöihin. Toinen vaikuttava aine bentsokaiini on paikallispuuduteaine, jonka vaikutus alkaa nopeasti ja kestää 5-15 minuuttia.

Toncils imeskelytableteilla ei ole tehoa streptokokin aiheuttamaan nielurisatulehdukseen.

Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Toncils imeskelytabletteja

Älä käytä Toncils imeskelytabletteja

Jos olet allerginen (yliperkkä) klooriheksidiinille tai bentsokaiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkichenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Toncils imeskelytabletteja.

Lapset

Alle 7-vuotiaalle lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Muut lääkevalmisteet ja Toncils imeskelytabletit

Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja alkoholin kanssa ei tunneta.

Kerro lääkärille tai apteekkichenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeita.

Raskaus ja imetyksessä

Lääkevalmisteita voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Toncils imeskelytabletit eivät heikennä ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.

Toncils imeskelytabletit sisältävät sorbitolia ja aspartaamia

- Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg sorbitolia per imeskelytabletti. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisten käyttöä (sinulle tai lapsellesi).
- Tämä lääkevalmiste sisältää 5 mg aspartaamia per imeskelytabletti. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Se voi olla haitallinen henkilölle, joilla on fenyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

3. Miten Toncils imeskelytabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määritellyt tai apteekkien henkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisille 1 imeskelytabletti 4-8 kertaa vuorokaudessa. 7-15-vuotiaiden annos on $\frac{1}{2}$ imeskelytablettia 4-8 kertaa vuorokaudessa. Alle 7-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan. Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Hampaiden pesun jälkeen suositellaan pidettäväksi 30 minuutin väli ennen Toncils imeskelytabletin ottamista. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Jos otat enemmän Toncils imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi:

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Toncils imeskelytabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseen unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Toncils imeskelytabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Klooriheksidiini saattaa värjätä hampaita ja niiden silikaatti- tai yhdistelmämäuvipipaikkoja sekä kieltää, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Väri kuitenkin häviää valmisten käytön lopettamisen jälkeen. Hoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä ohimenevää makuaistimuksen häiriintymistä tai polttavaa tunnetta kielessä. Klooriheksidiinin on kuvattu aiheuttaneen allergisia ja yliherkkyyssreaktioita, mutta ne ovat harvinaisia. Bentsokaiinin on kuvattu aiheuttaneen paikallisia allergia- ja yliherkkyyssreaktioita. Koko elimistöön liittyvät haittavaikutukset ovat harvinaisia. Methemoglobiinin esiintymistä veressä voi harvoin ilmetä, erityisesti lapsilla, joiden limakalvoilla on haavaumia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkien henkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Toncils imeskelytablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää

talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Toncils imeskelytabletit sisältävät

Vaikuttavat aineet ovat kloriheksidiiniidihydrokloridi 5 mg ja bentsokaiini 2 mg.

Toncils imeskelytablettienapuaineet ovat:

Ksylitoli 580 mg (E 967), sorbitoli 100 mg (E 420), aspartaami 5 mg (E 951), mikrokiteinen selluloosa, makrogoli 6000, kopovidoni, karmelloosinatrium, raskas magnesiumoksidi, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksiidi.

Makuaineet: Anisöljy, levomentoli ja eukalyptusöljy.

Toncils imeskelytabletit ovat laktoositomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauuskoko

Luonnonvalkoinen, harmaapilkullinen, pyöreä, tasainen ja jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 15 mm.

Pakkauuskoko: 24 imeskelytablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh: 03-615 600

Fax: 03-618 3130

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 16.10.2020

**Bipacksedel: Information till patienten
TONCILS 5 mg/2 mg sugtablett**

Klorhexidindihydroklorid, benzokain

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Toncils sugtablett är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Toncils sugtablett
3. Hur du använder Toncils sugtablett
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Toncils sugtablett ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Toncils sugtablett är och vad de används för

Toncils sugtablett används för munnens och svalgets desinfektion. Det verksamma ämnet klorhexidin är ett desinfektionsmedel med brett verkningspektrum, som inverkar på de flesta mikrobarter i munnen. Det inverkar på de flesta bakterier, jäst, dermatofyt-svampar och fettlösigt virus. Klorhexidin inverkar inte på bakteriesporer. Det andra verksamma ämnet, benzokain är ett lokalbedövningsmedel vars effekt börjar snabbt och varar 5-15 minuter.

Toncils sugtablett påverkar inte tonilliten förorsakad av streptokocker.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Toncils sugtablett

Använd inte Toncils sugtablett

Om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidindihydroklorid eller benzokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varngar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Toncils sugtablett.

Barn

För barn under 7 år bara enligt läkarens ordination.

Andra läkemedel och Toncils sugtablett

Interaktioner mellan andra läkemedel och alkohol känns inte.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Preparaten kan användas under graviditet och amning.

Körförstående och användning av maskiner

Toncils sugtablett nedslätter inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Toncils sugtablett innehåller sorbitol och aspartam

- Detta läkemedel innehåller 100 mg sorbitol per sugtablet. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiseras med hereditär

fruktosintolerans, en sällsynt, ärflig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

- Detta läkemedel innehåller 5 mg aspartam per sugtablet. Aspartam är en fenyłalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenyłketonuri (PKU), en sällsynt, ärflig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenyłalanin i kroppen.

3. Hur du använder Toncils sugtablett

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 sugtablett 4-8 gånger om dygnet. Dos för 7-15 åriga är ½ sugtablett 4-8 gånger om dygnet. För barn under 7 år enligt läkarens ordination.

Sugtabletten får långsamt smälta i munnen.

Toncils sugtablett rekommenderas att inta tidigast 30 minuter efter tandborstningen.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

Om du har tagit för stor mängd av Toncils sugtablett

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Toncils sugtabletten

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Toncils sugtablett orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Klorhexidin kanfärga tänderna och deras fyllningar av silikat- och kombinationsplast samt tungan, särskilt vid långvarig användning. Färgen försvisser dock efter avslutad behandling. I början av behandlingen kan det uppstå övergående smakförändring eller brännande känsa på tungan. Klorhexidin har beskrivits att ge upphov till allergiska och hypersensitiva reaktioner men de är sällsynta.

Bentsokain har beskrivits att ge upphov till lokala allergiska och hypersensitiva reaktioner.

Systemiska biverkningar är sällsynta. Methemoglobin i blodet kan uppstå särskilt hos barn som har haft sårnader på slemhinnor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Förvaring av Toncils sugtablett

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackning.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen efter Univ. senast. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är klorhexidindihydroklorid 5 mg och benzokain 2 mg.

Toncils sugtablettarnas hjälpmän är:

Xylitol 580 mg (E 967), sorbitol 100 mg (E 420), aspartam 5 mg (E 951), mikrokristallin cellulosa, makrogol 6000, kopolividon, karmellosnatrium, tung magnesiumoxid, magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Smakämnenär:Eukalyptusolja, anisolja och levomentol.

Toncils sugtabletterna är laktosfria.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Naturvit, gråprickig, rund, plan tablett med brytskåra. Diameter är 15 mm.

Förpackningsstorlek: 24 sugtabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Denna bipacksedel är reviderad senast 16.10.2020