

PAKKAUSSELOSTE

MacroBalans

6 g jauhe oraaliiliuosta varten
12 g jauhe oraaliiliuosta varten

Makrogoli 4000

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä valmiste on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Silti sinun tulee käyttää MacroBalansia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieyviä.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkauselosteesta mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkauselosteessa esitetään:

1. Mitä MacroBalans on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät MacroBalansia
3. Miten MacroBalansia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. MacroBalansin säilyttäminen ja hävittäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ MACROBALANS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

MacroBalans sisältää jauheena makrogoli 4000:a ja sitä käytetään ummetuksen hoitoon. Makrogoli sitoo itseensä vettä, jolloin suolen sisällön vesimäärä lisääntyy. Tämän seurauksena kova ulostemassa pehmenee, mikä johtaa normaaliin suolenliikkeisiin ja ulostamiseen. Makrogoli ei sido nestettä elimistöstä. Makrogoli poistuu elimistöstä ulosteiden mukana.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MACROBALANSIA

Älä käytä MacroBalansia

- jos olet allerginen (yliherkkä) makrogolille.
- jos sinulla on suolen ahtauma tai suolen tukkeuma.
- jos sinulla on suolen puhkeaman riski.
- jos sinulla on vakava tulehduksellinen suolistosairaus (esim. Crohnin tauti, haavainen paksusuolen tulehdus (ulseratiivinen koliitti), toksinen megakoolon).

Ole erityisen varovainen MacroBalansin suhteen:

- jos ummetus on kehittynyt tai pahentunut nopeasti. Taustalla voi olla suolen tukkeuma.

Käännä tällaisessa tilanteessa aina lääkärin puoleen.

Lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia. Keskustele lääkärin kanssa samanaikaisten lääkävainemisten käytöstä.

Raskaus ja imetus

MacroBalansin raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä ei ole kokemusta. Tämän vuoksi MacroBalansia tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin harkinnan mukaan.

3. MITEN MACROBALANSIA KÄYTETÄÄN

Ellei lääkäri ole toisin määrännyt, noudata seuraavia käyttö- ja annostusohjeita.

Annoksen voi ottaa vuorokaudenajasta riippumatta.

Ei alle 2-vuotiaille lapsille.

Tavallinen hoidon kesto on korkeintaan 14 vuorokautta. Hoito voidaan tarvittaessa toistaa. Lääkäri voi suosittelä myös pidempää hoitoaikaa.

Käyttöohje:

Annospusseille:

Avaa 1 annospussi ja kaada pussin sisältö n. 2 dl:aan (lasilliseen) nestettä: vettä tai mehua. Sekoita liuosta kunnes jauhe on liuennot kokonaan nesteeseen ja juo liuos. Pienille lapsille 6 g:n annospussi voidaan tarvittaessa sekoittaa 1 dl:aan (½ lasilliseen) nestettä.

Purkkipakkaukselle:

Mittaa 1–2 tasamittalusikallista jauhetta ja liuota se n. 2 dl:aan (lasilliseen) nestettä: vettä tai mehua. Sekoita liuosta kunnes jauhe on liuennot kokonaan nesteeseen ja juo liuos. Pienille lapsille 1 tasamittalusikallinen voidaan tarvittaessa sekoittaa 1 dl:aan (½ lasilliseen) nestettä.

Annostus:

Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset:

Tavallinen annos on 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen. Purkkipakkausta käytettäessä tavallinen annos on 2 tasamittalusikallista jauhetta (12 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen.

4–7 vuotiaat lapset:

Tavallinen annos on 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen. Purkkipakkausta käytettäessä tavallinen annos on 1 tasamittalusikallinen jauhetta (6 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen.

2–3 vuotiaat lapset:

Tavallinen annos on 1 annospussi (6 g) kerran vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen. Purkkipakkausta käytettäessä tavallinen annos on 1 tasamittalusikallinen jauhetta (6 g) kerran vuorokaudessa sekoitettuna nesteeseen.

Jos otat enemmän MacroBalansia kuin sinun pitäisi

Suuret annokset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Yliannostustapauksissa valmisteen käyttö tulee keskeyttää.

Jos unohdat ottaa MacroBalansia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kertaannoksen. Jatka MacroBalansin käyttöä annostusohjeen mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käännä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Tavallisia annoksia käytettäessä ei haittavaikutuksia yleensä esiinny. Suuria annoksia käytettäessä voi esiintyä ruoansulatuskanavan oireita, kuten vatsakipuja, vatsan turvotusta, ilmavaivoja, ripulia tai pahoinvointia. Yliherkkyysoireet ovat harvinaisia. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkauselosteesta mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. MAKROBALANSIN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vahingoittunut.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä annospussit ja purkkipakkaus kuivassa, huoneenlämmössä. Sulje purkkipakkauksen kansi tiiviisti käytön jälkeen.

Veteen valmistettu oraaliiliuos säilyy 24 tuntia jääkaapissa (2–8 °C). Tuotetta ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömän tuotteen hävittämisestä apteekista.

Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä MacroBalans sisältää

Vaikuttava aine on makrogoli 4000. Valmiste ei sisällä muita aineita. Laktoositon ja sokeriton.

Valmisteen kuvaus ja pakkaukset

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Pakkaukset:

- 20 x 6 g annospussia pahvikotelossa,
- 20 x 12 g annospussia pahvikotelossa,
- 750 g jauhetta muovipurkissa. Purkki sisältää 6 g:n mittalusikan.



0537



Valmistaja



Lue pakkauseloste ennen käyttöä



Eränumero



Säilytyslämpötilan yläraja



Käytettävä viimeistään



Säilytä kuivassa



Lääkinnällinen laite

Valmistaja ja markkinoija

Vitalabans Oy
Varastokatu 8
FI-13500
Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 3 615 600

Tämä pakkauseloste on päivitetty 23.9.2021

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

MacroBalans

6 g pulver till oral lösning
12 g pulver till oral lösning

Makrogol 4000

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Denna produkt är receptfritt vid behandling av lindriga besvär utan hjälp av läkare. MacroBalans måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar (se avsnitt 4) blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad MacroBalans är och vad det används för
2. Innan du använder MacroBalans
3. Hur du använder MacroBalans
4. Eventuella biverkningar
5. Hur MacroBalans ska förvaras och kastas
6. Övriga upplysningar

1. VAD MACROBALANS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

MacroBalans innehåller i en pulver makrogol 4000 och det används vid behandling av förstoppning. Makrogol binder vatten och därigenom ökar tarmens vatteninnehåll. Detta gör att den hårda avföringsmassan blir mjukare som leder till normaliserade tarmrörelser och att man får en laxerande effekt. Makrogol binder inte vätska från kroppen. Makrogol går ut från kroppen med avföring.

2. INNAN DU ANVÄNDER MACROBALANS

Använd inte MacroBalans

- om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol.
- om du har förfrängningar i tarmen.
- om du löper av risk för sår i tarmväggen.
- om du har svår inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom, sårig tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit), toxisk megacolon).

Var särskilt försiktig med MacroBalans

- om förstoppningen har utvecklats eller försämrats snabbt. Det kan vara tecken på förfrängningar i tarmen. I sådana situationer vänd dig alltid till läkare.

Samtidigt användning av läkemedel

Inga kända interaktioner.

Tala med din läkare vid användning av samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Det finns inte erfarenhet av användning av MacroBalans under graviditet eller amning. MacroBalans bör därför användas under graviditet och amning endast efter läkarens övervägande.

3. HUR DU ANVÄNDER MACROBALANS

Om läkaren inte ordinerat annat, följ följande bruks- och doseringsanvisningar.

Dosen kan tas när som helst.

Ej för barn under 2 år.

Vanlig behandlingstid är högst 14 dygn. Behandlingen kan upprepas om det är nödvändigt. Läkaren kan även rekommendera längre behandlingstid.

Bruksanvisning:

Dospåsar:

Öppna en dospåse och håll innehållet i ca 2 dl (ett glas) vätska: vatten eller saft. Rör om lösningen tills pulvret har löst upp sig helt i vätskan och drick lösningen.

Om nödvändigt, för små barn kan innehållet av 6 g dospåse blandas i 1 dl (½ glas) vätska.

Burkförpackning:

Mät 1-2 slät måttskedar pulver och lös det i ca 2 dl (ett glas) vätska: vatten eller saft. Rör om lösningen tills pulvret har löst upp sig helt i vätskan och drick lösningen.

Om nödvändigt, för små barn kan en slät måttsked pulver blandas i 1 dl (½ glas) vätska.

Dosering:

Vuxna och barn över 8 år:

Vanlig dosering är en dospåse (12 g) blandat i vätska 1-2 gånger per dygn.

Vid användning av burkförpackning är vanlig dosering 2 slät måttskedar pulver (12 g) blandat i vätska 1-2 gånger per dygn.

Barn 4-7 år:

Vanlig dosering är en dospåse (6 g) blandat i vätska 1-2 gånger per dygn.

Vid användning av burkförpackning är vanlig dosering en slät måttsked pulver (6 g) blandat i vätska 1-2 gånger per dygn.

Barn 2-3 år:

Vanlig dosering är en dospåse (6 g) blandat i vätska en gång i dygnet.

Vid användning av burkförpackning är vanlig dosering en slät måttsked pulver (6 g) blandat i vätska en gång i dygnet.

Om du har tagit för stor mängd av MacroBalans

Stora doser kan ge biverkningar. Vid överdosering bör användningen av produkten avbrytas.

Om du har glömt att ta MacroBalans

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt användningen av MacroBalans enligt dosanvisningar.

Om du har ytterligare frågor om användning av denna produkt kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vid vanlig dosering uppkommer oftast inga biverkningar. Vid höga doser kan det uppkomma symtom i mag-tarmkanalen såsom magknip, svullnad i buken, gaser, diarré eller illamående.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR MACROBALANS SKA FÖRVARAS OCH KASTAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte produkten om den är skadad.

Använd inte efter utgångsdatumet. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Dospåsar och burkförpackningen skall förvaras torrt, vid rumstemperatur.

Stäng locket av burkförpackningen tätt efter användning.

Färdigblandad oral lösning i vatten håller 24 timmar i kylskåp (2–8 °C).

Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar produkt som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är makrogol 4000. Produkten innehåller inga andra ämnen.

Laktosfri och sockerfri.

Produktens utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

Förpackningar:

- 20 x 6 g dospåsar i kartong,
- 20 x 12 g dospåsar i kartong,
- 750 g pulver i plastburk. Burken innehåller en 6 g måttsked.



0537



Tillverkare



Läs bipacksedeln före användning



Tillverkningsattnummer



Maximum förvaringstemperatur



Utgångsdatum



Förvaras torrt



Medicinteknisk produkt

Tillverkare och marknadsförare

Vitalabans Oy
Varastokatu 8
FI-13500
Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 3 615 600

Denna bipacksedel har uppdaterats senast 23.9.2021

**INDLÆGGSSEDDEL:
INFORMATION TIL BRUGEREN**

MacroBalans
6 g pulver til oral opløsning
12 g pulver til oral opløsning
Macrogol 4000

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få MacroBalans uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for MacroBalans

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MacroBalans
3. Sådan skal du bruge MacroBalans
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevares og bortskaffes MacroBalans
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

MacroBalans indeholder macrogol 4000 som pulver, og det anvendes til behandling af forstoppelse.
Macrogol binder vand og øger mængden af vand i tarmindholdet. Herved blødgøres hård afføring, hvilket medfører normale tarmbevægelser og tarmudtømmning. Macrogol påvirker ikke kroppens væskebalance. Macrogol udskilles med afføring.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MACROBALANS

Brug ikke MacroBalans

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for macrogol
- hvis du har en forsnævring eller blokering af tarmen
- hvis du har risiko for hul på tarmvæggen
- hvis du har alvorlig tarm sygdom med betændelse (f.eks. morbus Crohn, colitis ulcerosa eller toksisk megacolon)

Vær ekstra forsigtig med at bruge MacroBalans

- hvis du har forstoppelse, som udvikler eller forværrer sig hurtigt. Dette kan skyldes blokering af tarmen. Du bør altid informere din læge i dette tilfælde.

Brug af anden medicin

Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af MacroBalans sammen med lægemidler.
Tal med din læge ved samtidig brug af anden medicin.

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelig information om anvendelse af MacroBalans under graviditet og amning. Derfor bør du kun bruge MacroBalans under graviditet og amning efter aftale med lægen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE MACROBALANS

Hvis lægen ikke har anbefalet andet, så følg nedenstående anvisning for anvendelse og dosering.
Du kan tage en dosis uafhængigt af tidspunkt på dagen.
Må ikke anvendes til børn under 2 år.
Varigheden af behandling er sædvanligvis højst 14 dage. Behandlingen kan gentages ved behov.
Din læge kan anbefale længere behandlingsvarighed.

Sådan skal du bruge MacroBalans

Breve:

Åben ét brev og opløs indholdet i ca. 2 dl (et fyldt glas) væske: vand eller juice. Rør indtil pulveret er helt opløst i væsken og drik opløsningen.

Ved behov til børn kan indholdet af ét brev med 6 g opløses i 1 dl (et halvt glas) væske.

Beholder:

Afmål 1-2 strøget måleskeer af pulveret og opløs indholdet i ca. 2 dl (et fyldt glas) væske: vand eller juice. Rør indtil pulveret er helt opløst i væsken og drik opløsningen.

Ved behov til børn kan 1 strøget måleske af pulveret opløses i 1 dl (et halvt glas) væske.

Dosering:

Voksne og børn over 8 år:

Den sædvanlige dosis er ét brev (12 g) 1-2 gange dagligt opløst i væske.

Ved brug af pulver i beholder er den sædvanlige dosis

2 strøget måleskeer (12 g) 1-2 gange dagligt opløst i væske.

Børn 4-7 år:

Den sædvanlige dosis er ét brev (6 g) 1-2 gange dagligt opløst i væske.

Ved brug af pulver i beholder er den sædvanlige dosis 1 strøget måleske (6 g) 1-2 gange dagligt opløst i væske.

Børn 2-3 år:

Den sædvanlige dosis er ét brev (6 g) 1 gang dagligt opløst i væske.

Ved brug af pulver i beholder er den sædvanlige dosis 1 strøget måleske (6 g) 1 gang dagligt opløst i væske.

Hvis du har taget for meget MacroBalans pulver til oral opløsning

Store doser kan medføre bivirkninger. Ved overdosis skal anvendelse af produktet afbrydes.

Hvis du har glemt at bruge MacroBalans

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen som beskrevet i instruktionen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Ved brug af normale doser opstår der sædvanligvis ikke bivirkninger. Ved brug af store doser kan der forekomme symptomer fra mave-tarmkanalen som f.eks. mavesmerter, mæthed, luft i tarmene, diarré eller kvalme. Overfølsomhedsreaktioner er sjældne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. SÅDAN OPBEVARES OG BORTSKAFFES MACROBALANS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktet må ikke anvendes hvis det er beskadiget.

Brug ikke MacroBalans efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar breve og beholder tørt og ved stuetemperatur.

Låget på beholderen skal være tæt tillukket efter brug. Blanding opløst i vand kan anvendes i 24 timer, hvis det opbevares i køleskabet (2-8°C).

Produktet må ikke bortskaffes via spildevand eller husholdningsaffald. Spørg angående bortskaffelse af ubrugt produkt på apoteket. Så beskytter du naturen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

MacroBalans, pulver til oral opløsning:

Det aktive indholdsstof er macrogol 4000. Produktet indeholder ikke andre indholdsstoffer.

MacroBalans er lactose- og sukkerfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvidt til lysebrunt pulver.

Pakningsstørrelser:

- 20 x 6 g breve i æske
- 20 x 12 g breve i æske
- 750 g pulver i plastbeholder. Beholderen indeholder en måleske svarende til 6 g.



0537



Fremstillers



Læs indlægssedlen for brug



Batch



Øverste lagertemperaturgrænse



Udløbsdato



Opbevares tørt



Medicinsk udstyr

Fremstillers og distributør

Vitalbans Oy
Varastokatu 8, FI-13500, Hämeenlinna, Finland

Tlf. +358 3 615 600

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

23.09.2021

**PAKNINGSVEDLEGG:
INFORMASJON TIL BRUKEREN**

MacroBalans
6 g pulver til mikstur, oppløsning
12 g pulver til mikstur, oppløsning
Makrogol 4000

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Dette produktet er reseptfritt og kan brukes til behandling av milde sykdomssymptomer uten å kontakte lege. Likevel må MacroBalans brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget (se pkt. 4).

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva MacroBalans er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker MacroBalans
3. Hvordan du bruker MacroBalans
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du lagrer og kaster MacroBalans
6. Ytterligere informasjon

1. HVA MACROBALANS ER, OG HVA DET BRUKES MOT

MacroBalans inneholder makrogol 4000 som pulver, og brukes for å behandle forstoppelse. Makrogol binder vannet, og øker vannmengden i tarmen. Dette gjør at hard avføring blir bløtere, noe som medfører normalisering av tarmbevægelsen og tømming av tarmen. Makrogol påvirker ikke kroppens væskebalanse, og utskilles med avføringen.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MACROBALANS

Brug ikke MacroBalans

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor makrogol.
- hvis du har en innsnevring eller blokkering i tarmen.
- hvis du har risiko for perforasjon (hulldannelse) i tarmveggen.
- hvis du har en alvorlig betennelsessykdom i tarmen (Slik som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller toksisk megacolon (utvidelse av tykktarmen)).

Hvis forsiktighet ved bruk av MacroBalans

- dersom forstoppelsen har utviklet eller forverret seg hurtig. Dette kan skyldes en blokkering i tarmen.

Ta alltid kontakt med legen din dersom du opplever dette.

Brug av legemidler sammen med MacroBalans

Ingen kjente interaksjoner.

Snakk med legen din om bruken av ulike medisiner samtidig.

Graviditet og amning

Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon vedrørende bruk av MacroBalans ved graviditet og amning. MacroBalans bør derfor kun brukes etter avtale med lege dersom du er gravid eller ammer.

3. HVORDAN DU BRUKER MACROBALANS

Dersom du ikke har fått annen informasjon fra legen skal du følge doseanbefalingene og bruksanvisningen nedenfor:

Dosen kan tas uavhengig av tidspunkt.

Gis ikke til barn under 2 år.

Vanlig behandlingsvarighet er maks. 14 dager. Behandlingen kan om nødvendig gjentas. Legen kan også anbefale lengre behandlingsvarighet.

Bruksanvisning:

Doseposer:

Åpne 1 dosepose og tøm innholdet i ca. 2 dl (ett fullt glass) væske: vann eller juice. Rør om til pulveret er fullstendig oppløst, og drikk løsningen.

Ved behov til barn kan innholdet i 1 dosepose (6 g) blandes i 1 dl (et halvt glass) væske.

Pulverpakning:

1-2 strøken måleskjeer pulver løses i ca. 2 dl (ett fullt glass) væske: vann eller juice. Rør om til pulveret er fullstendig oppløst, og drikk løsningen.

Ved behov til barn kan 1 strøken måleskje pulver blandes i 1 dl (et halvt glass) væske.

Dosering:

Voksne og barn over 8 år:

Vanlig dose er 1 dosepose (12 g) 1-2 ganger daglig blandet ut i væske.

Dersom du bruker pulverpakningen er vanlig dose 2 strøken måleskjeer pulver (12 g) 1-2 ganger daglig blandet ut i væske.

Barn fra 4 til 7 år:

Vanlig dose er 1 dosepose (6 g) 1-2 ganger daglig blandet ut i væske.

Dersom du bruker pulverpakningen er vanlig dose 1 strøken måleskje pulver (6 g) 1-2 ganger daglig blandet ut i væske.

Barn fra 2 til 3 år:

Vanlig dose er 1 dosepose (6 g) 1 gang daglig blandet ut i væske.

Dersom du bruker pulverpakningen er vanlig dose 1 strøken måleskje pulver (6 g) 1 gang daglig blandet ut i væske.

Dersom du tar for mye av MacroBalans

Store doser kan gi bivirkninger. Ved overdosering skal behandlingen avbrytes.

Dersom du har glemt å ta MacroBalans

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemte dose. Fortsett behandlingen i henhold til bruksanvisningen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette produktet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Bivirkninger forekommer vanligvis ikke ved normal dosering. Ved bruk av høye doser kan du få bivirkninger i mage eller tarm, slik som magesmerter, stinnhet, oppblåsthet, diaré eller kvalme. Overfølsomhetsreaksjoner er sjeldne.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU LAGRER OG KASTER MACROBALANS

Opbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke brukes hvis produktet er skadet eller ødelagt.

Brug ikke MacroBalans etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Doseposer og pulverpakning oppbevares tørt, og ved romtemperatur.

Pulverpakningen må lukkes godt igjen etter bruk.

Pulver som er oppløst i vann er holdbart inntil 24 timer dersom det oppbevares i kjøleskap (2-8 °C).

Produktet skal ikke kastes via avløpsvann eller i husholdningsavfall. Hvis du skal kvelte deg med ubrukt produkt, spør på ditt nærmeste apotek. Ved å gjøre dette beskytter du naturen.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av MacroBalans

Virkestoff er makrogol 4000. Produktet inneholder ingen andre ingredienser. MacroBalans inneholder ikke sukker eller laktose.

Hvordan MacroBalans ser ut og innholdet i pakningen

Hvitt til lysebrunt pulver.

Pakningsstørrelser:

- 20 x 6 g doseposer i eske,
- 20 x 12 g doseposer i eske,
- 750 g pulver i plastbeholder. En 6 g måleskje medfølger beholderen.



0537



Tilvirker



Les pakningsvedlegget for bruk



Batch



Øvre grense for romtemperatur ved oppbevaring



Utløpsdato



Oppbevares på et tørt sted



Medisinsk utstyr

Tilvirker og markedsføringsansvarlig

Vitalbans Oy
Varastokatu 8, FI-13500, Hämeenlinna, Finland

Tlf. +358 3 615 600

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert

23.9.2021