Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

TRIMETIN® 100 mg tabletti
TRIMETIN® 160 mg tabletti
Trimetopriimi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä TRIMETIN-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja
3. Miten TRIMETIN-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. TRIMETIN-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä TRIMETIN-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

TRIMETIN-tabletteja käytetään akuuttien virtsatieinfektioiden hoitoon ja kroonisten virtsatieinfektioiden jatkohoitoon.
TRIMETIN-tabletit sisältävät trimetopriimiä, joka on antibiootti. Lääke haittaa bakteerien lisääntymistä estämällä niiden foolihapposynteesiä. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä on elimistössä tarpeellinen määrä riittävän kauan. Tämän vuoksi kuuri on otettava loppuun ja annosteluohjetta noudatettava.

Trimetopriimiä, jota TRIMETIN sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja

Älä käytä TRIMETIN-tabletteja
- jos olet allerginen trimetopriimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on vaikea maksasairaus
- jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
- jos sinulla on vaikea imeytymishäiriö
- jos sinulla on foolihapon puutos tai foolihappotasoon vaikuttava muu lääkitys
- jos olet raskaana (ensimmäisellä raskauskolmanneksella) tai saatat olla raskaana

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja,
- jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta,
- jos sinulle on joskus ilmaantunut trimetopriimin käytön jälkeen vaikea ihottuma tai ihon kuoriutumista, rakkulanmuodostusta ja/tai suun haavaumia.

Ole erityisen varovainen TRIMETIN-valmisteen suhteen:
Trimetopriimihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoreaktioita, kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymää, toksista epidermaalista nekrolyysiä ja yleisoireista eosinofiilista oireyhtymää (DRESS). Lopeta trimetopriimin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat minkä tahansa kohdassa 4 kuvatuista näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyvistä oireista.

Muut lääkevalmisteet ja TRIMETIN
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, sekä luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.
Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti trimetopriimin kanssa. Tällaisia lääkeaineita ovat digoksiini (sydänlääke), fenytoiini (epilepsialääke), tsidovudiini (HIV-lääke), rifampisiini (tuberkuloosilääke), metotreksaatti (reuma- ja syöpälääke), siklosporiini, tietyt nesteenpoistolääkkeet ja barbituraatit.

TRIMETIN-tabletit ruuan ja juoman kanssa
TRIMETIN-tabletit tulisi ottaa runsaan nesteen kera.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Lääkettä käytetään raskauden aikana vain lääkärin harkinnan mukaan.
Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana käytettynä trimetopriimi voi suurentaa keskenmenoriskiä. Trimetopriimia ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana käyttäneiden äitien lapsilla voi olla suurentunut synnynnäisten epämuodostumien riski. Riski koskee erityisesti hermostoputken sulkeutumishäiriötä, huuli- ja suulakihalkiota ja sydänvikaa.

Lääke kulkeutuu äidinmaitoon, joten lääkityksen aikana ei saa imettää.

Ajaminen tai koneiden käyttö
Trimetopriimi ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten TRIMETIN-tabletteja käytetään

Käytä TRIMETIN-tabletteja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Jos lääkettä otetaan virtsatietulehduksen hoitoon, on tärkeää juoda tavallista enemmän nestettä koko hoidon ajan.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän TRIMETIN-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta trimetopriimin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat minkä tahansa seuraavista oireista:
- vartalolle kehittyvät punoittavat läiskät, joiden keskellä on usein rakkulanmuodostusta, ihon kuoriutuminen, suun, nielun, nenän, sukuelinten ja silmien alueella esiintyvät haavaumat. Ennen näitä vakavia ihoreaktioita voi esiintyä kuumetta ja flunssankaltaisia oireita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi) (hyvin harvinaiset haittavaikutukset).
- laaja-alainen ihottuma, kuume ja imusolmukkeiden suurentuminen (DRESS oireyhtymä tai lääkeyliherkkyysoireyhtymä) (esiintymistiheys tuntematon).

Muut haittavaikutukset:
Yleiset (*voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 100:sta*): pahoinvointi, ihottumat.
Melko harvinaiset *(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)*: oksentelu, kutina, kielitulehdus.
Harvinaiset (*voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta*): verenkuvan muutokset
Hyvin harvinaiset *(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):* aistiharhat, aivokalvotulehdus, sappitukos, anafylaktinen sokki, lääkekuume, vaikeat ihoreaktiot (kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi) ja suolistotulehdus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. TRIMETIN-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysohjeita.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä TRIMETIN-tabletti sisältää
- Vaikuttava aine on trimetopriimi 100 mg tai 160 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat:
  Glyseroli 85 %, kalsiumvetyfosfaatti dihydraatti, krospovidoni, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi.

TRIMETIN-tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

TRIMETIN-tabletti 100 mg ja 160 mg:
Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

TRIMETIN 100 mg: 30, 100 tablettia.
TRIMETIN 160 mg: 10, 20, 100 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna
Puh.: (03) 615 600
Fax.: (03) 618 3130

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 16.01.2026.

Bipacksedel: Information till patienten

TRIMETIN® 100 mg tablett
TRIMETIN® 160 mg tablett
Trimetoprim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad TRIMETIN-tabletter är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du tar TRIMETIN-tabletter
3. Hur du använder TRIMETIN-tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur TRIMETIN-tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad TRIMETIN-tabletter är och vad de används för

TRIMETIN-tabletter används vid behandling av akuta urinvägsinfektioner och vid långtidsbehandling av kroniska urinvägsinfektioner.
TRIMETIN-tabletter innehåller trimetoprim som är en antibiot. Medicinen verkar störande på bakteriernas förökning genom att hindra deras folsyrasyntes. Medicinen påverkar bäst då det finns tillräckligt i kroppen för en tillräckligt lång tid. Därför bör man alltid ta kuren till slut och följa doseringsanvisningen.

Trimetoprim som finns i TRIMETIN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar TRIMETIN-tabletter

Använd inte TRIMETIN-tabletter
- om du är allergisk mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har svår leversjukdom
- om du har svår njurinsufficiens
- om du har svår absorptionsstörning
- om du har folsyrabrist eller behandlas med andra läkemedel som påverkar folsyranivån
- om du är gravid (första 3 månaderna) eller kan vara gravid

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder TRIMETIN-tabletter
- om du har njurinsufficiens,
- om du någon gång har fått ett allvarligt hudutslag eller hudfjällning, blåsbildning och/eller sår i munnen efter att du tagit trimetoprim.

Var särskilt försiktig med TRIMETIN:
Allvarliga hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats i samband med behandling med trimetoprim. Sluta ta trimetoprim och uppsök omedelbart läkare om du får något av symtomen på dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Andra läkemedel och TRIMETIN-tabletter
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det inkluderar också naturmedel eller naturprodukter.
Vissa läkemedel kan förorsaka biverkningar om de används samtidigt med trimetoprim. Dessa läkemedel är digoxin (hjärtmedicin), fenytoin (epilepsiamedicin), zidovudin (HIV-medicin), rifampicin (tuberkulosmedicin), metotrexat (mot reumatism och cancer), ciclosporin, vissa vätskedrivande mediciner och barbiturater.

TRIMETIN-tabletter med mat och dryck
TRIMETIN-tabletter tas med riklig mängd vätska.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Medicinen används under graviditeten endast enligt läkarens ordination.
Detta läkemedel ska inte användas under graviditetens första tre månader. Behandling med trimetoprim under graviditetens första tre månader kan öka risken för missfall. Barn födda av mödrar som behandlats med trimetoprim under graviditetens första 3 månader kan ha en ökad risk för medfödda missbildningar, särskilt neuralrörsdefekter (där ryggraden och ryggmärgen inte bildas korrekt), läpp- och gomspalter (där läppen och gommen inte bildas korrekt) och missbildningar som påverkar hjärtat.

Eftersom läkemedlet passerar över i modersmjölk skall man inte amma under behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner
Intag av trimetoprim påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.

3. Hur du använder TRIMETIN-tabletter

Använd alltid TRIMETIN-tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Om medicinen är avsedd för behandling av urinvägsinfektion, är det viktigt att dricka mera än vanligt under hela kuren.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av TRIMETIN-tabletter
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda trimetoprim och sök vård omedelbart om du får något av följande symtom:
- rödaktiga fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i mun, svalg, näsa, på könsorganen och i ögonen. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom / toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynta biverkningar).
- utbredda hudutslag, feber och förstorade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom) (ingen känd frekvens).

Andra biverkningar:
Vanliga *(kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare)*: illamående, utslag.
Mindre vanliga *(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)*: kräkningar, klåda, inflammation på tungan.
Sällsynta *(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)*: blodbildsförändringar
Mycket sällsynta *(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)*: hallucinationer, hjärnhinneinflammation, gallstopp, anafylaktisk chock, drogfeber, allvarliga hudreaktioner (såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och tarminflammation.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur TRIMETIN-tabletter ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum (EXP) som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är trimetoprim 100 mg eller 160 mg i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är:
  Povidon, krospovidon, glycerol 85 %, natriumlaurylsulfat, kalciumvätefosfat dihydrat, mikrokristallin sellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

TRIMETIN-tabletter är laktosfria och osötade.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

TRIMETIN-tablett 100 mg och 160 mg:
Vit, rund, konvex tablett med brytskåra. Diametern är 9 mm.

TRIMETIN 100 mg: 30, 100 tabletter.
TRIMETIN 160 mg: 10, 20, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus
Tel.: (03) 615 600
Fax.: (03) 618 3130

Denna bipacksedel ändrades senast 16.01.2026.